LA TUBERCULOSIS



¿TOS CON FLEMA POR MAS DE 15 DÍAS?

SE CURA CUANDO SE DETECTA A TIEMPO

Y SI TERMINAS EL TRATAMIENTO

JEFATURA UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD

LIC. Enfer: Janneth Esquen Vicente

¿QUÉ ES TUBERCULOSIS?

Es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa. Es causa por una por el micoorganismo llamado Bacilo de Koch que ataca principalmente a los pulmones aunque también a otros órganos.

ES CURABLE Y PREVENIBLE



¿CÓMO SE CONTAGIA?

Se transmite de persona a persona a través del aire, cuando la persona enferma(y sin tratamiento) tose, estornuda o habla.



Toser

Estornudar

Hablar
Y
ntar

Cuando el microbio(Bacilo de Koch) ingresa a tu organismo se multiplica con rapidez y produce heridas en el pulmón.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

- Tos con flema por mas de 15 días.
- Debilidad y cansancio.
- Perdida de peso.
- Falta de apetito
- Fiebre y sudor nocturno.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Examen de esputo :

Consiste en tomar muestras de esputo(flema que se produce con la tos),donde deberán ser depositadas en frasco limpio y de boca ancha; la cual será procesada en el laboratorio.

Prueba cutánea de la tuberculina o PPD: (Se realiza en menores de 5 años)

Consiste en aplicar debajo de la piel del brazo el PPD, el cual será evaluado por la enfermera después de 2 días de la aplicación ,si la pápula excede la medida de 10 ml pasara consulta medica.

A la evaluación del medico, este le mandara a realizar una radiografía de tórax:

Es una prueba que permite ver la extensión de la enfermedad pulmonar, su evolución y sus secuelas.

TRATAMIENTO

El tratamiento es supervisado, la administración de medicamentos es sin interrupciones por 6 meses.

El apoyo y afecto de la familia y amigos son muy importantes para lograr la curación.

EL TRATAMIENTO CONTRA LA TUBERCULOSIS ES GRATUITO

¿ Porque no se debe abandonar el tratamiento?

Si el enfermo/a abandona o es irregular en su tratamiento **NO SE CURA.**



La enfermedad se vuelve **RESISTENTE** a los medicamentos y el enfermo deberá seguir otro tratamiento más difícil y prolongado y se puede volver crónico.

PREVENCION

- En los niños, aplicar la vacuna del BCG al recién nacido.

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

- Taparse la boca con el antebrazo al toser, estornudar.

- Consume alimentos sanos y de forma balanceada.

- Buena ventilación, iluminación y aire fresco tanto en la vivienda como en el trabajo.

GRACIAS